По материалам национального портала козоводов forum.kozovod.com
с использованием методики В. Завадовской

Правила и нормы кормления козлят

После рождения первые порции молозива козленок должен получить не позднее 30-40 мин. после рождения. Молозиво дается из стерильной бутылочки со строгим соблюдением чистоты. Вымя козы перед первым сдаиванием тщательно моется. Первые объемы порции молозива не должны превышать 40-60 мл.

За первые сутки козленок должен получить количество молозива равное 10% массы своего тела при рождении. Частота кормления должна быть не менее 6 раз в сутки первые семь дней, 5 раз в последующие 2-3 недели. Затем, 4 раза в сутки в течение 1-2 мес. Количество молока, употребляемого за сутки козленком, постепенно увеличивается к возрасту 1 мес. до 1800 мл.

Возможна и другая схема кормления, которую предлагают козоводы-практики. Поить козлят молоком в первый месяц после рождения можно 3 раза в день. Количество молока, выпиваемого козленком за один раз, составляет 1 стакан (200-250 мл). Иногда допускается превышение этой нормы, но только если нет угрозы расстройства пищеварения. Такой режим кормления более удобен для любого хозяйства, чем совет выпаивать козлят каждые 1.5-2 часа, что бывает неприемлемо в наших условиях.

В. Завадовская, ссылаясь на опыт немецких хозяев, приводит следующие суточные нормы кормления козлят молоком в мл, которые приведены в Таблице.

Таблица. Суточные нормы кормления козлят молоком (В. Завадовская), мл

Дни	1-я неделя	2-я неделя	3-я неделя
1	500	1050	1550
2	600	1100	1600
3	700	1200	1700
4	700	1250	1750
5	800	1350	1850
6	900	1400	1900
7	1000	1500	2000

Кормление козленка производится из бутылочки с соской, т.к. физиология пищеварительной системы козлят требует обязательного акта сосания. Когда приучают козлят пить из мисочки, как описывает автор В. Завадовская, совсем не обязательно вынуждать козленка вставать на колени, он может стоять и на всех четырех ножках, а миска – на возвышении на уровне морды; можно и просто держать его на руках. Бывает так, что козленок начинает пить сразу без всякой помощи, бывает, что ему первое время все же приходится давать мизинец, но как правило, через два дня он уже нормально пьет молоко. Впоследствии от мисочки придется отказаться и перейти к кастрюльке (или другой емкости с высокими бортами), поскольку подросшие козлята часто разливают молоко из мисочки.

Примерно в двухнедельном возрасте козленок начинает проявлять интерес к грубым кормам (сено) и зеленой траве, но до месячного возраста основным питанием для козленка является молоко. Козлятам можно предлагать сено, но концентратов, каши и сочных кормов до месячного возраста давать не следует.

С начала пятой недели жизни козленка ему начинают цельное молоко понемногу разбавлять водой, прибавляя овсяную дерть, льняную муку, отруби, с таким расчетом, чтобы к седьмой неделе козленок уже не получал бы молока, а только одну «болтушку». К молоку иногда добавляют кашу - манную, кукурузную, овсяную или ячную. Прибавка этих ингредиентов для усиления питательности разбавленного молока делается аккуратно, в небольшом количестве и в строгой постепенности, чтобы исподволь приучить желудок молодого животного переваривать такие корма. Здесь надо соблюдать осторожность, чтобы не вызвать расстройства желудка, об этом тоже говорит В. Завадовская. Если возня с кашей причиняет хозяевам нежелательные лишние заботы, то можно продолжать кормление цельным молоком, при этом давая понемногу козлятам сено, отруби или выгоняя на пастьбу. Так же, как и в случае с добавками, козленка следует приучать к хорошему луговому сену и к свежей траве постепенно. Ко всякому корму следует прибавлять немно-

го поваренной соли, что прекрасно влияет на пищеварение и повышает аппетит. Козликов цельным молоком кормят на месяц дольше, чем козочек.

Если козлята выкармливаются матерью, то ее необходимо все же выдаивать, так как часто козлята высасывают не все молоко.

Давать козлятам коровье молоко, как это делается, например, во Франции, ни в коем случае не следует; козочки от этого не будут молочными, а козлики могут быть малоплодными.

Молоко матери или другой козы должно даваться парным; надаивают его для каждого раза отдельно.

По достижении козлятами двухмесячного возраста, они становятся менее восприимчивыми к различным изменениям в режиме кормления, менее подвержены расстройствам желудка, и сами эти расстройства, если и случаются, то не столь вредоносны, как, скажем, в месячном возрасте.

Следует помнить, что чистота при кормлении козлят имеет огромное значение, охлажденное в посуде молоко скоро закисает от загрязнения, начинает бродить и вызывает поносы, нередко заканчивающиеся смертью.

В помещении, где находятся козлята, обязательно должна быть устроена кормовая решетка, которую рекомендуют использовать для кормления сеном молодняка примерно до достижения четырехмесячного возраста. После 4-х месяцев козлят можно содержать со взрослыми козами и кормить из кормушек для взрослых коз.

При правильном кормлении и достаточном движении на открытом воздухе козлята быстро развиваются и растут. В возрасте от полутора до трех с половиной месяцев козлят обыкновенно отнимают от матерей.

Некоторые рекомендации по выращиванию козлят

- В областях с нехваткой селена в окружающей среде в первые 7 дней козленку необходимо сделать инъекцию препаратов селена. Будьте осторожны с дозировкой!
- В таких странах как Америка, Англия и др. с возраста 7 дней козлята получают профилактику в виде пассивной и активной иммунизации против ряда заболеваний, в т.ч. столбняка новорожденных. К сожалению, у нас этот вопрос не разработан.
- С 7-дневного возраста добавляйте в бутылочку по одной капле в день поливитаминов.
- Соблюдайте чистоту при уходе и кормлении козлят. Соски и бутылочки мойте и кипятите после каждого кормления. Если вы кормите козлят молоком от разных коз, то для избежания заболевания козлят стерилизуйте молоко перед кормлением!
- Следите за прибавкой веса козлятами. В 2 мес. козленок не должен весить менее 12,75 кг.
- В возрасте 9-14 дней проведите обезроживание козлят. Не используйте для этого подручные средства. Пользуйтесь заводскими термокаутерами. После прижигания присыпьте ранку порошком Раносан.
- В возрасте 10 недель проведите первую обработку копыт.
- В 14 недель рекомендуется проведение первой дегельминтизации.
- К 4-5 месяцам постепенно сокращайте количество выпиваемого козленком молока, увеличивая количество других кормов (комбикорм, свежие овощи).

Комментарий козовода-практика Игуниной Елены:

«Первый год я отбирала козлят от коз сразу после рождения. Сама их выкармливала из бутылочки. Количество выпиваемого молока примерно соответствовало приведенной выше таблице В. Завадовской, но немного меньше. Любые попытки разбавить молоко каким-либо другим продуктом (овсяный кисель, пшеничный кисель, коровье молоко, смесь для искусственного вскармливания) приводили к поносу. Ну и, правду сказать, выкормить из бутылочки одновременно около 20 козлят - это напряжно.

Теперь я поступаю так. До месяца козы сами выкармливают козлят. При этом я коз всё равно дою трижды в день. Молока, конечно, немного, но - режим есть режим. Когда козлятам исполняется месяц, я на ночь отбираю их от козы, пересаживаю в отдельную загородку. Утром коз выдаиваю и возвращаю им на день козлят. Голодные козлята высасывают из мамок всё, что осталось и раздаивают их гораздо лучше меня.

Вечером снова пересаживаю малышей в отдельную загородку. И так делаю до трёх месяцев. Потом козлят окончательно перевожу в отдельную загородку.

Так и молока стало больше, и рукам легче».